



AUFBEWAHRUNGS- UND HALTBARKEITSBEDINGUNGEN FÜR ARZNEIMITTEL

Medikamente sind unsere größten Helfer, wenn wir krank sind.

Eine unangemessene Lagerung oder die Nichteinhaltung von Lagerungsvorschriften kann zu einer Wirkungsminde rung beitragen oder sogar ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Aufbewahrung

Es ist üblich, Medikamente in einer Schublade im Bad oder in der Küche aufzubewahren, doch aufgrund der Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sind diese Orte in der Wohnung nicht besonders geeignet. Empfehlungen für eine sichere Aufbewahrung sind:




Wählen Sie einen dunklen, kühlen und trockenen Ort, setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus.




Lassen Sie die Originalverpackung und die Behälter immer in aufrechter Position



Lesen Sie die Aufbewahrungsbedingungen in der Packungsbeilage.



Außerhalb der Reichweite von Kindern.



Geben Sie das Öffnungsdatum an und achten Sie auf das Verfallsdatum




Wenn das Medikament abgelaufen oder leer ist, werfen Sie es nicht in den Abfall, sondern bringen Sie es zur SIGRE-Stelle in Ihrer Apotheke



Haltbarkeit

Ein Hustensaft ist nicht dasselbe wie eine Creme oder Augentropfen. Für jede Arzneimittelform ist eine besondere Aufbewahrung erforderlich, die in der Packungsbeilage beschrieben ist, aber diese sind die am häufigsten verwendeten:



Augentropfen werden in der Regel 4 Wochen nach dem Öffnen entsorgt und müssen während des Gebrauchs nicht kühl gehalten werden..

Cremes und Salben können durch hohe Temperaturen im Sommer beeinträchtigt werden. Es ist auch wichtig, den Dosierer mit Watte zu reinigen und ihn fest zu verschließen. Lesen Sie die Haltbarkeit der Salbe nach dem Öffnen



Die Insulinpens sollten vor dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt werden, nach dem Öffnen jedoch bei Raumtemperatur. Bitte vermerken Sie das Öffnungsdatum, da die Wirksamkeit nach 4 Wochen des Gebrauchs abnimmt.

Einige Antibiotika, die zu Hause durch Zugabe von Wasser zubereitet werden, müssen im Kühlschrank aufbewahrt werden (zwischen 2 °C und 7 °C) und haben in der Regel ein maximales Haltbarkeitsdatum von 7 bis 10 Tagen.



Quelle: Spanische Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (AEMPS)